

## توصیه های دارویی در سفر

- در طول سفر داروهای خود را به همراه داشته باشید. تا در صورت پیدا نکردن داروخانه دچار مشکل نشوید.
- چنانچه ضمن حرکت وسایل نقلیه دچار سرگیجه و حالت تهوع میشود؛ مصرف ۱۱۲ قرص دیمن هیدرینات، نیم ساعت قبل از شروع سفر و تکرار قرص هر ۴۶ ساعت یک بار میتواند کمک کننده باشد. حداقل ۸ قرص در روز استفاده شود. در صورت بارداری یا شیردهی با پزشک یا داروساز مصرف شود.



- اگر به امارات متحده عربی و یا عربستان سفر می کنید، از همراه بردن داروهای آرامبخش مانند داروهای دیازپام، اگزازیام، لورازیام، داروهای مسکن کدئین دار (مانند استامینوفن کدئین، اکسپکتورانت کدئین) و ترکیبات روانگردان جداً اجتناب نمایید. براساس قوانین این کشور، متهمین به حمل این داروها با

مجازات سنگینی مواجه خواهند بود. در صورت نیاز به مصرف این داروها، نسخه پزشک را همراه داشته باشید و یا نسبت به جایگزینی داروها با پزشک یا داروساز مشورت نمایید.

• چنانچه به برخی از کشورهای افریقایی و یا آسیایی سفر می کنید مطمئن شوید که آیا تزریق واکسن خاصی (مانند منژیت و یا تب زرد) پیش از سفر مورد نیاز است یا خیر.



• جهت پیشگیری از گزش حشرات در محیط های گرم و مرطوب و استوایی، پشه بند، حشره کش های خانگی و یا پماد و اسپری دافع حشرات همراه داشته باشید.

- همراه داشتن جعبه کمک های اولیه، خصوصاً در مورد خانواده هایی که فرزند خردسال دارند، همچنین همراه داشتن پوشک، شیرخشک شیرخوار، درجه تب، داروهای بدون نسخه مانند شربت تب بر، شربت سرماخوردگی، قطره یا شربت مولتی ویتامین و آهن، پماد سوختگی، پنبه و گاز استریل و دیگر داروهایی که کودک در حال مصرف می باشد.



- نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحويل گرفتن دارو از داروخانه بپرسید و هیچگاه داروهای خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارک شده است و یا در شیشه عقب اتومبیل (حتی در زمستان) قرار ندهید. داروهای یخچالی را همراه با یخ و یا در داخل ظروفی که دارو را خنک نگه می دارند حمل نمایید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  
معاونت غذا و دارو  
مدیریت تهارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت

## توصیه‌های دارویی در سفر



برنامه سلامت نوروزی  
۱۴۰۲

۱. فراهم نمودن انسولین و داروهای مصرفی و سرنگ برای تمام مدت سفر.
۲. همراه داشتن دستگاه یا نوار کنترل قند خون، قند حبه ای، نبات، بیسکوئیت و آب میوه برای درمان کاهش احتمالی قند خون. همراه داشتن میان وعده مناسب (مانند میوه و ساندویچ کوچک).



- در خصوص بیماران مبتلا به فشار خون بالا، بهتر است دستگاه فشار سنج و داروهای مصرفی همراه بیمار باشد و از مصرف مواد غذایی حاوی نمک مانند آجیل و تنقلات و مواد غذایی چرب خودداری شود.

- بطور کلی در صورت نیاز می‌توانید سوالات خود را در زمینه اطلاعات دارویی و موارد مسمومیت، ببا کارشناسان مراکز اطلاع رسانی داروها و سموم به شماره تلفن ۱۹۰ درمیان بگذارید.



- نحوه نگهداری داروها را از دکتر داروساز، هنگام تحويل گرفتن دارو از داروخانه بپرسید و هیچگاه داروهای خود را در اتومبیلی که زیر نور آفتاب پارک شده است و یا در شیشه عقب اتومبیل (حتی در زمستان) قرار ندهید. داروهای یخچالی را همراه با یخ و یا در داخل ظروفی که دارو را حنک نگه می‌دارند حمل نمایید.
- برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا و انتشار بیماری، می‌بایست واکسن کرونا و یادآورهای آن تزریق شده باشد.



- در خصوص بیماران دیابتی که انسولین تزریق می‌کنند توجه به موارد زیر در هنگام سفر (براساس توصیه‌های مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران)، ضروری می‌باشد:



برای دیدن تمام موارد آموزشی معاونت  
غذا و دارو اسکن کنید