



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشت

نام واکسن: اسپوتنیک V

کشور سازنده : روسیه

نوع واکسن : ds DNA ویروس غیرفعال

تعداد دوز (تزریق) : ۲ نوبت

(ویال نوبت اول آبی ، ویال نوبت دوم قرمز)

فاصله بین دو نوبت : حداقل ۲۱ روز

کاربرد گروه سنی : بالای ۱۸ سال

اثر بخشی واکسن : ۹۱/۶٪

افرادی که نباید واکسن تزریق کنند:

- ◀ افرادی که سابقه واکنش‌های حساسیتی شدید دارند
- ◀ افرادی که دچار بیماری حاد یا بدون تب هستند. (این افراد حدود ۲ هفته بعد از بهبودی می توانند مراجعه نمایند).
- ◀ افرادی که به دنبال تزریق نوبت اول دچار هر نوع عارضه شدید شده‌اند مصرف نوبت دوم واکسن را دارند.
- ◀ خانم‌های باردار و دوران شیردهی

افرادی که باید با احتیاط و با مشورت پزشک واکسن بزنند:

افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن کبدی، کلیوی، بیماری‌های متابولیک (دیابت کنترل نشده و اختلال عملکرد تیروئید) اختلالات خونی (مانند هموفیلی یا اختلالات انعقادی) صرع و سایر بیماری‌های اعصاب

Sputnik V



مرکزی و یا سابقه سکتة مغزی، بیماری‌های عروق کرونر، التهاب عضلات قلب، بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی (اتوایمیون) و مبتلایان به سرطان‌های بدخیم، باید قبل از تزریق با پزشک معالج خود مشورت نمایند.

عوارض واکسن:

عوارض شایع: حالت شبه آنفلوآنزای خفیف (تب، لرز، دردهای عضلانی و مفصلی، گلودرد، احتقان و آبریزش بینی، ضعف، احساس ناخوشی و سردرد) و یا درد و تورم و قرمزی محل تزریق (این عوارض عموماً خود به خود بهبود می‌یابند)

عوارض کمتر شایع: تهوع، بی‌اشتهایی و بزرگی غدد لنفی و بندرت گیجی و سنکوپ

اقدامات لازم بعد از تزریق واکسن :

- بعد از دریافت واکسن تا ۳۰ دقیقه در مرکز بمانید.
- در صورت بروز علائم خفیف مانند درد، تب و آبریزش بینی از مسکن مانند استامینوفن یا آنتی‌هیستامین استفاده کنید و در صورت بروز عوارض شدید با مرکزی که واکسن تزریق شده تماس بگیرید.

سفیران سلامت تهران در فضای مجازی

@safiranesalamatetehran