

تزریق بوتاکس

بوتاکس سمی است که توسط باکتری کلستریدیوم بوتولینوم تولید میشود. ماده موثره این دارو مخلوطی از سم کلستریدیوم بوتولینوم نوع A با هما گلوپتینین می باشد.

بوتاکس همچون حاوی آلبومین و لاکتوز است و به صورت پودر عرضه میشود. برای تزریق، بوتاکس در سرم نمکی حل می شود. این دارودر محل اتصال عصب و عضله با مهار آزاد سازی یک واسطه شیمیایی به نام استیل کولین از انتهای عصب که به طور طبیعی باعث انقباض عضله می شود، به فلج شدن ماهیچه وانقباض غیرطبیعی آن منجر می شود.

از بوتاکس برای رفع چین و چروکهای نیمه فوقانی صورت (پیشانی، خط اخم و اطراف چشم) استفاده می شود. تاثیر دارو موقت و بین ۴ تا ۶ ماه می باشد و باعث کاهش عمیق چین و چروک ها می گردد ولی فلج کامل عضله نمی دهد. با شروع از بین رفتن تاثیر دارو، تزریق مجدد لازم می شود.



موارد منع مصرف بوتاکس:

- ۱- بیماران با سابقه مصرف سیکلوسپورین و آنتی بیوتیک از دسته آمینو گلیکوزیدها و دی پنیسیلیمین
- ۲- بیماران با سابقه ابتلا به میاستنی گراویس، سندرم لامبرت، ایتون و ALS
- ۳- بیماران با سابقه بیماریهای تنفسی
- ۴- بیماران با سابقه سختی یا اشکال در بلع
- ۵- بارداری و شیر دهی
- ۶- حساسیت به بوتاکس یا فرآورده های آن

مراقبتهای لازم قبل از تزریق بوتاکس :

۱- میزان دارو و محل تزریق را پزشک معالج تعیین می نماید.

۲- قبل از تزریق، صورت، گردن، دست یا پا ی خود را با آب و صابون به خوبی شستشو داده و تمیز نمائید .

۳- تزریق بوتاکس درد ناک نیست و نیازی به بی حسی نیست.

۴- در صورت ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، بیماریهای خاص یا مزمن به پزشک اطلاع دهید.

۵- در صورت مصرف وارفارین، هپارین، آسپرین و یا هر نوع دارو به پزشک اطلاع دهید.

۶- در صورت ابتلا به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت، ایدز و ... به پزشک معالج اطلاع دهید.

۷- اگر جزء بیماران دیالیزی، پیوندی و یا بیماران مبتلا به بیماریهای خاص می باشید به پزشک معالج اطلاع دهید.

۸- در صورت بارداری و یا شیر دهی به پزشک معالج اطلاع دهید.

۹- در صورت داشتن حساسیت به هر نوع دارو به پزشک معالج اطلاع دهید.

۱۰- در صورت داشتن هر گونه واکنش غیرطبیعی مثل دانه های پوستی و یا علائم شبیه آنفلوآنزا به هر تزریق سمی در گذشته به پزشک معالج اطلاع دهید.

۱۱- در صورت مصرف هر گونه دارو یا داشتن اعتیاد به مواد مخدر و الکل به پزشک معالج خود اطلاع دهید ۱۲- ۱ تا ۲ روز قبل از تزریق از مصرف مسکن(غیر از استامینوفن)، ویتامین E و داروهای مختلف گیاهی خودداری نمائید .

۱۳- ۷ تا ۱۰ روز قبل از تزریق از مصرف آسپرین خودداری نمائید.

۱۴- قبل از ورود به اتاق عمل پوست، گان (لباس اتاق عمل سر پایی) از داروخانه تهیه نموده و هنگام ورود به اتاق عمل گان را پوشیده و پس از خروج از اتاق عمل آن را خارج نمائید.

۱۵- قبل از مراجعه به اتاق عمل پوست، غذا میل نموده و ناشتا به اتاق عمل مراجعه نمائید.

۱۶- لطفاً قبل از ورود به اتاق عمل موبایل خود را خاموش نمائید.

مراقبتهای لازم پس از تزریق بوتاکس :

۱- پس از تزریق بوتاکس روی محلهای تزریق به تناوب به مدت ۳ تا ۵ دقیقه کمپرس یخ بگذارید.

۲- به مدت ۲ تا ۳ ساعت بعد از تزریق سر و گردن خود را خم نمائید و در حال عمودی (ایستاده یا نشسته) قرار داشته و از دراز کشیدن و خوابیدن پرهیز نمائید.

۳- به مدت ۲ تا ۴ ساعت پس از تزریق، عضلات ناحیه تزریق را با اخم کردن و بالا بردن ابروها و خندیدن مرتباً منقبض و متبسط نمائید. زیرا دارو در عضلاتی که انقباض فعال داشته باشد بهتر عمل می نماید.


۴- از ماساژ و دستکاری ناحیه تزریق به مدت ۳ تا ۴ ساعت خودداری نمائید.

۵- در صورت بروز سر درد استامینوفن هر ۶ ساعت مصرف نمائید. از مصرف پروفن، ژلوفن، ایندو متاسین، مفنامیک اسید و آسپرین به عنوان مسکن خودداری نمائید.

۶- بروز ضعف عضلانی در عضلات اطراف محل تزریق طبیعی است و ظرف مدت چند روز بر طرف می شود.

۷- کبودی، قرمزی و تورم در اطراف محل تزریق طبیعی است و گذاشتن کمپرس یخ در ۲۴ ساعت اول و کمپرس گرم در ۴۸ ساعت بعد در محلهای تزریق به رفع آن کمک می نماید. ۲ تا ۴ روز بعد از تزریق کبودی، قرمزی و تورم مناطق تزریق از بین خواهد رفت.

۸- در صورت تزریق بوتاکس دور چشم و یا پلک ممکن است بیمار افتادگی خفیف پلک، احساس فشار و سنگینی در پشت و بالای چشمها و پلکها و یا سختی در وضوح دید داشته باشد. این اثرات در صورت وقوع چند روز بعد از تزریق مشاهده می شود و در مدت ۵ روز الی یک هفته برطرف می شود. ولی در صورت بروز خشکی چشم باید سریعاً به چشم پزشک مراجعه نماید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران | بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

تزریق بوتاکس



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

آدرس بیمارستان: خیابان وحدت اسلامی-میدان وحدت
اسلامی- بیمارستان پوست رازی
تلفن ۳- ۵۵۶۰۹۹۵۱ | تلفکس: ۵۵۶۲۰۳۰۰

وب سایت:
www.razihospital@tums.ac.ir
www.tums.ac.ir/razi

PRIME

SKIN CARE PRODUCTS

BY: DR. AKHAVI LAB.

لوسیون سفت کننده پریم Prime Lift-up Lotion



- حاوی ترکیبات معجزه آسای پپتیدی سینیک و آرژیرلین با مکانیسم شبه بوتاکس
- قابل استفاده به عنوان نگهدارنده اثر تزریقات بوتاکس
- قابل استفاده به جای تزریق بوتاکس در موارد ممنوعیت تزریق و یا عدم تمایل به تزریق بوتاکس
- قابل استفاده برای تمام نواحی صورت و گردن
- حاوی ترکیبات آبرسان و ویتامینه
- قابل استفاده در تمام ساعات شبانه روز
- دارای قابلیت لیفتینگ آنی و یکنواخت سطح پوست
- قابل استفاده قبل از آرایش

مطابق با FRENCH
استاندارد کیفی QUALITY
کشور فرانسه PRODUCT

۹- در صورت بروز واکنشهای آلرژیک مثل ایجاد راشهای پوستی یا علائم شبیه آنفلوآنزا یا هر عارضه جانبی مشکل ساز یا مرتبط سریعاً به پزشک معالج مراجعه نمایید.

۱۰- اثر دارو معمولاً از ۲ روز بعد از تزریق شروع می شود و پس از ۷ تا ۱۰ روز به حداکثر تاثیر خود می رسد.

۱۱- پس از تکمیل شدن اثر دارو از منقبض کردن مکرر عضلات صورت، اخم کردن و بالا بردن ابروها اجتناب کنید.

۱۲- به مدت ۳ الی ۵ روز بعد از تزریق بوتاکس از رفتن به استخر، سونا، جکوزی و سولاریوم خودداری نمایید.