

مسومیتهاي غذایی:

مسومیت غذایی عبارتست از مجموعه اختلالاتی که در نتیجه خوردن غذاهاي فاسد در بدن به وجود می آيد. باکتری ها، کپک ها، حشرات، انگل ها، گرما، رطوبت، نور، اکسیژن، مجاورت غذا با بقایای سموم دفع آفات نباتی و از عوامل موثر در ایجاد مسومیت غذایی هستند.

مسومیت با موادغذایی می تواند در اثرآلودگی غذا در جریان تولید فراورده های غذایی، آماده سازی و نگهداری آنها ایجاد شود.

شانه های مسومیت غذایی

شانه های مسومیت غذایی عبارتند از:

- اسهال
 - دل درد
 - استفراغ
 - حالت تهوع
 - سردرد
 - تب
 - ضعف و خستگی عضلانی
- 

چه افرادی در معرض خطر بیشتری برای

مسومیت غذایی هستند؟

سالمدان، کودکان، بانوان در دوران حاملگی و شیردهی، افرادی که بیماری های ضعیف بودن سیستم ایمنی یا بیماری های سوخت و ساز مثل دیابت دارند در خطر بیشتری برای مسومیت غذایی هستند.

مهم ترین راهکارهای ساده برای پیشگیری از مسومیت غذایی عبارتند از:

- رعایت بهداشت فردی
- مصرف آب آشامیدنی سالم
- شستن دست ها با آب و صابون قبل از آماده کردن یا خوردن غذا
- مصرف غذاها و سبزیجات پخته
- عدم مصرف سالاد و سبزیجاتی که از شستشو و ضدغونی آنها اطمینان نیست.
- مصرف تمامی میوه ها صورت پوست کنده
- عدم نگهداری غذای پخته بیش از ۲ ساعت بیرون از یخچال (۱ ساعت در صورت گرمی هوا)

قوطی کنسرو را پیش از استفاده حتماً
۲۰ دقیقه بجوشانید و کنسروهایی که در قوطی
آنها آثار نشت، برآمدگی و فرورفتگی و
زنگزدگی است، استفاده نکنید.

- عدم مصرف غذاهاي با احتمال فساد سريع (تخم مرغ، محصولات لبنی غیر پاستوريزه، غذاهاي حاوي سس های مایونز و سس کچاپ)، سوسیس، کالباس، کنسرو ماهی، کنسرو ذرت و لوبیا، کشك خام و عسل غیر کارخانه ای
- استفاده از غذاهايی مانند کباب یا جوجه کباب که از ترکیب مواد غذایی کمتری تهیه می شوند، در غذانوری های بین راهی
- عدم خرید تنقلات و محصولات غذایی از فروشندها دوره گرد
- در سفر از محصولات لبنی و خوراکی هایی که دارای بسته بندی دارای نشان سلامت و مجوز بهداشتی هستند استفاده نمایید و از خرید و مصرف فرآورده های خوراکی فله ای جدا اجتناب نمایید.

بوتولیسم


بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی است که در اثر خوردن غذاهای سمی رخ می دهد و سیستم عصبی فرد مبتلا را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد که موجب آسیب به عصب های مرکزی و عضلانی و حتی مرگ خواهد شد. چنانچه در سفر از غذاهای کنسرو شده استفاده می نمایید، استفاده می نمایید، با جوشاندن کنسرو به مدت ۲۰ دقیقه می توان از خطر مسمومیت کشنده بوتولیسم پیشگیری نمود.

علائم و نشانه های بوتولیسم:

علائم و نشانه های بوتولیسم به صورت تأخیری (۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف غذای آلوده به باکتری) و به صورت تاری دید، دوینی، افتادگی پلک، عدم توانایی حرکتی، سختی در بلع، اختلال تکلم و بیوست ظاهر می شود. بیمار مبتلا به بوتولیسم باید در کوتاه ترین زمان ممکن به یک مرکز درمانی مجهز منتقل و درمان شود.

دستور طلایی برای پیشگیری از مسمومیت غذایی

”پختن و خوردن غذا در همان روز“ است.



برای دیدن تمام موارد آموزشی معاونت غذا و دارو اسکن کنید

برنامه سلامت نوروز ۱۴۰۲



استفراغ

تب

درد شکمی

اسهال

مسومیت