

درمان لوپوس با داروهای ضد مالاریاها

داروهای ضد مالاریا در کنترل آرتریت مرتبط با لوپوس، راش پوستی، زخم های دهانی و دیگر نشانه ها مانند خستگی و تب بسیار موثر هستند. دارو های ضد مالاریا به عنوان داروهای کنترل کننده سیستم ایمنی جزو دارو های اصلی و مهم در لوپوس تلقی می شود.

این داروها در درمان دیسکوئید اریتماتوسیستمیک بسیار موثر می باشند. گرچه داروهای ضد مالاریا در کنترل بیماری شما بسیار موثر می باشند، استفاده از آن ها نیازمند صبر و حوصله است. استفاده از آنها، قبل از مشاهده ی هر گونه تغییری در علائم بیماری، هفته ها یا ماه ها زمان می برد.

عوارض جانبی محتمل

این موارد شامل ناراحتی معده، کاهش اشتها، استفراغ، اسهال، تاری دید، اختلال در تمرکز، سردرد، عصبانیت، تحریک پذیری (حساسیت)، گیجی، ضعف ماهیچه، خشکی و خارش پوست، ریزش موی خفیف، راش، تغییر در رنگ پوست و کبودی غیر عادی می باشد.

موارد احتیاط

بیش از مقدار تجویز شده دارو مصرف نکنید.

این دارو را همراه با دیگر داروها مانند داروهای بدون نسخه بدون مشورت با پزشک یا پرستارتان مصرف نکنید. به هر پزشک، پرستار یا دندانپزشکی که مراجعه می کنید بگویید که داروهای آنتی مالاریا را برای درمان لوپوس مصرف می کنید.

احتیاط !

عارضه ی جانبی و محتمل داروهای آنتی مالاریا رساندن آسیب به شبکیه چشم است. هر چند این عارضه با مقادیر اندک دارویی که تجویز می شود نادر است، بسیار اهمیت دارد که قبل از درمان با این داروها و هر ۶ تا ۱۲ ماه پس از مصرف این داروها سلامت چشمهایتان را بررسی کنید.