

شخصی که از نظر جنسی فعال است بایستی:



- کنترل مرتب برای بیماری STD، حتی در صورت عدم وجود علائم و مخصوصاً در صورت داشتن روابط جنسی با شریک جنسی جدید داشته باشد.
- آگاهی از علائم STD داشته و در صورت دیدن کوچکترین علائم، به واحدهای درمانی مراجعه کند.
- اجتناب از داشتن روابط جنسی در زمان قاعده‌گی، که خانمهای مبتلا به ایدز بیشتر مستعد گرفتن عفونت در طی این زمان هستند.
- اجتناب از تماسهای مقعدی، و در صورتی که این عمل انجام می‌شود، آقایان از کاندوم استفاده کنند.
- اجتناب از دوش واژینال، به دلیل اینکه بعضی از باکترینها وارد واژن شده و احتمال خطر STD را بیشتر می‌کند.

ابتلاء به بیماریهای مقارب‌تی جنسی احتمال آسیب پذیری شخص را در صورت نزدیکی با اشخاص آلوده به ایدز را افزایش می‌دهد.

STD در خانمهای شایعتر از آقایان است. ممکن است **STD**‌ها باعث سرطان سرویکس شوند.

کاهش خطر ابتلاء به **STD**، از راههای زیر امکان دارد:

- عدم رابطه جنسی با غیر از همسراستفاده صحیح و مداوم از کاندوم در آقایان
- استفاده از سرنگهای تمیز برای تزریق
- پیشگیری و کنترل بیماریهای STD، برای کاستن خطر ابتلاء به عفونت ایدز و کاهش خطر ابتلاء به STD
- به تاخیر انداختن اولین رابطه جنسی تا حد ممکن در افراد مجرد

بیماری مقارب‌تی چیست؟

بیماریهای عفونی شایعی می‌باشند که در حین فعالیت جنسی منتقل می‌شوند. این عفونتها نه تنها باعث زخم و درد و سوزش و تورم در ناحیه تناسلی می‌شوند، بلکه می‌توانند عوارض خطربناکی مثل نازائی و سرطان و مرگ به دنبال داشته باشند.

گاه این بیماری بدون علامت است. تعدادی از این بیماریها عبارتنداز: سوزاک، سیفلیس، هپاتیت B، ایدز، زگیل تناسلی، تب خال تناسلی.

پیش از انجام هرگونه رابطه‌ی جنسی کلیه آزمایش‌های پیشکی را انجام دهید تا از سلامت فردی خود و شخص مقابل آگاهی لازم را بدد آورید.

علائم معمول عفونتهای مسری جنسی چیست؟

سوزش و خارش در ناحیه تناسلی، زخم و جوش یا توده در ناحیه تناسلی و اطراف مقعد، ترشح چرکی در مجرای ادراری یا دستگاه تناسلی زنانه، اجابت مزاج دردناک، زگیل در مقعد و نواحی تناسلی، بوی بد و متعفن از ناحیه تناسلی و درد موقع ادرار کردن.

اگر علائم به خودی خود از بین برود؛ بدین معنی نیست که عفونت از بین رفته است و مداوا الزامی است.

درمان بیماری های مقاربته

علاوه بر درمان بیمار باید همسر و یا شریک جنسی او نیز درمان شود. اگر یک طرف درمان شود چون بیماری مسری است، چرخه انتقال ادامه می یابد. افراد مبتلا تا بهبودی کامل باید از تماس جنسی خودداری کنند و این خودداری تا از بین رفتن علائم و دوره کامل درمان باید ادامه داشته باشد. اگر مبتلایان به بیماریهای مقاربته نتوانند از فعالیت جنسی تا بهبودی کامل خودداری کنند، باید در تمام مراحل نزدیکی از کاندوم استفاده نمایند.

امروزه بیماریهای مقاربته قابل درمان هستند، ولی ممکن است عوارض آنها قابل درمان نباشند. همانطور که ایدز درمان ندارد و بنابراین مهم است که از رفتارهایی که سبب آلودگی می شوند پرهیز شود.



محصولات بتیس بر پایه آخرین دستاوردها و مکشوفات گیاهان دارویی و ترکیبات موثر طبیعی، با همکاری معتبرترین کمپانی ها و شرکت های اروپایی تولید کننده مواد اولیه و با جدیدترین فرمولاسیون روز دنیا که مورد تایید سازمان های FDA، CE و ... است، تهیه و تولید می شود.

محصولات بتیس در ۱۰ گروه تخصصی تولید و عرضه میگردد.

- ۱ - مراقبت های روزانه
- ۲ - تخصصی بانوان
- ۳ - پوست های چرب و مستعد آکنه
- ۴ - روشن کننده و ضد لک
- ۵ - ضد آفتاب
- ۶ - ضد پیری
- ۷ - مراقبت از مو
- ۸ - کودک
- ۹ - پوست های خشک و حساس
- ۱۰ - تخصصی آقایان

88



بیمارستان فوق تخصصی
پوست رازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
درمانی تهران

بیماری مقاربته S.T.D



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

آدرس بیمارستان :
خیابان وحدت اسلام، میدان وحدت اسلام، بیمارستان پوست رازی

تلفن-۳- ۵۵۶۰۹۹۵۱

تلفکس: ۵۵۶۲۰۳۰۰

وب سایت:

www.razihospital@tums.ac.ir

www.tums.ac.ir/razi