

آمادگیهای لازم قبل از تزریق ژل:

- ۱- میزان و نوع ژل و محل تزریق را پزشک معالج تعیین می نماید.
- ۲- قبل از تزریق ژل و مراجعته به اتاق عمل، صورت را با آب و صابون شستشو داده و از چربی، دارو و یا مواد آرایشی پاک نمائید.
- ۳- در صورت ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، بیماریهای خاص یا مزمن به پزشک معالج اطلاع دهید.
- ۴- در صورت مصرف آسپرین، وارفارین، هپارین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی و یا هر نوع داروی دیگری به پزشک معالج اطلاع دهید.
- ۵- در صورت ابتلا به هر نوع داروی پوستی، التهاب پوستی و یا بیماریهای یافته همبند به پزشک معالج اطلاع دهید.
- ۶- در صورت ابتلا به بیماریهای خون (کم خونی، کمیود پلاکت، تالاسمی، لوسمی و ...) به پزشک معالج خود اطلاع دهید.
- ۷- در صورت ابتلا به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت، ایدز و ... به پزشک معالج اطلاع دهید.
- ۸- در صورت بارداری و یا شیردهی به پزشک معالج اطلاع دهید.
- ۹- در صورت داشتن حساسیت به هر نوع دارو به پزشک معالج اطلاع دهید.
- ۱۰- اگر جزء بیماران دیالیزی، پیوندی و یا بیماران مبتلا به بیماریهای خاص می باشد به پزشک معالج اطلاع دهید.

تزریق ژل (GEL INJECTION):

هر روز افراد بسیاری با استفاده از عمل های مختلف زیبائی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و از زندگی خود لذت بیشتری می برند. این اطلاعات فقط برای آگاهی شما ارائه شده است. بدینهی است جزئیات بیشتر و میزان سودمندی چنین عملی برای شما مواردی هستند که میتوانید با پزشک معالج خود حضوراً مطرح نمائید. ژل که در طب جهت تزریق استفاده می شود، قوامی شبیه ژله خوراکی دارد. این ژل از موادی ساخته شده است که قابل جذب بوده، برای بدن بی ضرر است و دارای ماندگاری طولانی مدت است. ژلهای مختلفی توسط کارخانه های متفاوت برای مصارف پزشکی تهیه و توزیع می شود. لذا ژلهای با کیفیت ها و قیمتها متفاوتی وجود دارد. تزریق ژل تحت بی حسی موضعی و توسط سوزن بسیار باریک و نازک انجام می شود و تقریباً بی درد است.

موارد استفاده ژل در صورت:

- ۱- کلفت تر کردن و برجسته کردن لب
- ۲- برجسته کردن چانه
- ۳- پر کردن خط خنده
- ۴- پر کردن چین های گوشه های دهان در افراد مسن
- ۵- پر کردن چین بین دو ابرو
- ۶- پر کردن چین و چروکهای عمیق صورت یا جای جوش
- ۷- پر کردن فرو رفتگی اسکار ناشی از زخمها قدمی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی تهران
پوست رازی

تزریق ژل



کمیته آموزش پرستاری و پزشکی
بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی

با همکاری **FACEDOUX**




کرم ضد چروک لیفتازو™

رفع کننده چروکهای سطحی پوست
جلوگیری از شای و افتدگی پوست
محرك ساخت رشته های کلازن و الاستین
حاوی کمپلکس ضد پیری و ضد چروک لیپوزومال


کرم روشن کننده پیگمازو™
ضد لک و روشن کننده قوه
قاده هیدرولیکینون و اسید کوچیک
حاوی کمپلکس روشن کننده لیپوزومال
در دو مخصوص مسروت و بدن



کرم مرطوب کننده هیدرازو™
مرطوب کننده ۲۴ ساعته پوست
پیشگیری از پیری زودرس پوست
در دو نوع مخصوص مسروت و بدن
حاوی کمپلکس مرطوب کننده لیپوزومال



کرم دور چشم اکتیزوج™
برطرificate کننده پف و تیرگی دور چشم
ضد چروک و ضد افتدگی پوست اطراف چشم
مرطوب کننده و بازسازی کننده
حاوی کمپلکس لیپوزومال



کرم ترمیم کننده سیکاژو™
مناسب جهت قبل و بعد از اعمال درماتولوژیک
(لیزر درمانی، پیلینگ، درم ابرزن)
ترمیم کننده زخمها و سوختگیها
قابل استفاده بر روی زخم باز
حاوی سلولهای سادی گیاهی و کمپلکس ترمیم کننده لیپوزومال



کرم ضد جوش آکنه زو™
ضد آکنه قوه
کاهش دهنده فعالیت غدد چربی پوست
جلوگیری از رشد باکتریهای مواد آکنه
کمک به جمع شدن منافذ باز پوست
حاوی کمپلکس ضد آکنه و کاهش دهنده چربی لیپوزومال

فرآورده های درموکازمتیک فیس دوکس

گرم در ۴۸ ساعت بعد روند بھبودی را تسريع می نماید.

۶- از ساییدگی و ماساژ و مالش پوست صورت جداً خودداری نماید.

۷- در صورت بروز درد و یا سردرد استامینوفن کدئین مصرف نموده و از مصرف آسپرین،

بروفن، ژلوفن، مفنامیک اسید، ایندو متاسین و دیکلوفناک به عنوان مسکن خودداری

نماید.

۸- داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج خصوصاً آنتی بیوتیک و مسکن را طبق

دستور مصرف نماید.

۹- در صورت داشتن پوست تیره پس از تزریق ژل احتمالاً واکنشهای التهابی خواهد

داشت که طبیعی است.

۱۰- در صورت تزریقهای مکرر ژل، در ناحیه تزریق پوست دچار بی رنگی مداوم خواهد

شد.

۱۱- در صورت تزریقهای مکرر ژل، در محل تزریق یک برجستگی مشخص بوجود

می آید.

۱۲- به مدت یک هفته از خوردن غذاهای سفت و سخت، لقمه های جویدنی، ادویه جات،

فلفل و غذاهای محرك خودداری نماید.

۱۳- از هر گونه استرس، تنشهای عصبی، عصبانیت، داد، فریاد و خودداری نماید.

۱۱- در صورت داشتن پروترز در صورت یا تزریق ژل غیرقابل جذب در گذشته به

پزشک معالج اطلاع دهید.

۱۲- قبل از ورود به اتاق عمل پوست، گان و لباس اتاق عمل سریایی از داروخانه تهیه

نموده و هنگام ورود به اتاق عمل گان را پوشیده و پس از خروج از اتاق عمل آن را خارج

نماید.

۱۳- قبل از مراجعة به اتاق عمل، غذا میل نموده و ناشتا به اتاق عمل مراجعه ننماید.

۱۴- لطفاً قبل از ورود به اتاق عمل موبایل خود را خاموش نماید.

مراقبتها لازم بعد از تزریق ژل:

۱- پس از تزریق ژل روی محل تزریق به مدت ۳ تا ۵ دقیقه کمپرس بخ گذاشته و بعد

از ۲ تا ۳ دقیقه مجدداً کمپرس بگذاردید.

۲- به مدت ۲ تا ۳ ساعت بعد از تزریق ژل سر و گردن را خم نموده و دراز نکشید و در

طی این مدت بایستید، بشنیدن و باراه بروید.

۳- بعد از تزریق ژل به مدت ۳ ساعت به تناوب کمپرس سرد روی محلهای تزریق

بگذاردید.

۴- به مدت چند روز در هنگام استراحت و خواب یک بالش اضافه زیر سر بگذارید.

۵- بروز درد، ادم، التهاب و قرمزی در صورت و کبودی، خون مردگی و یا کوفتگی در

محل تزریق و اطراف محل تزریق ژل طبیعی است . این عوارض در فاصله ۵ روز الی

یک هفته بعد از تزریق بھبود می یابد. گذشتن کمپرس بخ در ۲۴ ساعت اول و کمپرس